

c. సాధారణ పద్ధతులు

- వేరు కుళ్ళు వ్యాధి ఉన్నట్లు అనుమానం ఉన్నటువంటి వ్యవసాయ భూమిని ఎండకాలలో లోతుగా దుక్కి దున్ని ఆరబెట్టడం వల్ల వ్యాధికారక సుక్ష్మజీవులను సమర్థవంతంగా నాశనం చేయవచ్చును.
- నారుమొక్కలను రోగకారకాలులేని నారుమళ్ళలో పెంచడం ద్వారా వ్యాధి విస్తరణను అరికట్టవచ్చును.
- వ్యాధి సోకి చనిపోయినటువంటి మొక్కలను పూర్తిగా తొలగించి కాల్చివేయాలి.
- పశువుల లేదా సేంద్రీయ ఎరువులను తగిన మొత్తాదులో వాడి నేలలో సేంద్రీయ కర్పన మొత్తాదును పెంచాలి.
- ఎకరానికి 800 కిలోల వేపపిండిని/చెక్కను సంవత్సరానికి రెండు దఫాలలో వేయాలి.

d. భౌతిక పద్ధతి

- నేల సౌరకరణం: నేలను ప్లాస్టిక్ కవరుతో కప్పించడం ద్వారా నేల వేడెక్కి అక్కడ ఉండే వ్యాధికారక సుక్ష్మజీవులు, కలుపు మొక్కలు, నెమటోడ్లు, కీటకాలను సమర్థవంతంగా నిర్మూలించవచ్చును.



అనుసరించవలసిన దశలు: పొలమును 30 సెం.మీ లోతుగా దుక్కిదున్నడం ▶ నీటి పారుదల ▶ 0.04/0.06 యం యం పారదర్శక ప్లాస్టిక్ కవరుతో కప్పి ఉంచడం ▶ ప్లాస్టిక్ కవరు చివరి అంచులను మట్టి పెల్లలను ఉపయోగించి గట్టిగా కప్పి ఉంచడం ▶ 10-15 రోజుల పాటు ప్లాస్టిక్ కవరుతో కప్పి ఉంచాలి.

e. వ్యాధి నిరోధక మల్చరీ వంగడాలు

- ప్రస్తుతం సాగు చేస్తున్న మల్చరీ రకాలలో జిఘ మల్చరీ రకం మద్యమ వేరు కుళ్ళు వ్యాధి నిరోధక శక్తి కలిగిన వంగడం.

రాట్ ఫిక్స్ తయారీదారుల కోసం సంప్రదించవలసిన వివరాలు

1. **వేరి ఆగ్రో ప్రోడక్ట్స్:** ప్లాట్ సంఖ్య- 1 2 , మెటగళ్ళి ఇండస్ట్రీయల్ ఏరియా, మైసూరు, 570016, కర్ణాటక. సెల్ నంబరు: 09482706193.
2. **కామత్ క్లోరోటెక్: (అఫీస్):** # 3వ వృత్తం, P. S లైన్, కాటన్ పేట్, బెంగళూరు, 560053, కర్ణాటక. సంప్రదించవలసిన సంఖ్యా: 09886255293, 080-41514958.

ఈ మెయిల్: blr.kamatchloro@gmail.com

(పరిశ్రమ): # 256, 257, 267, మరియు 268 3వ ఫాజ్, K I A D B ఇండస్ట్రీయల్ ఏరియా, మాలూరు, కోలార్జిల్లా, 563160, కర్ణాటక.

వ్యాసకర్తలు:

అరుణ్ కుమార్ జి.యస్, రఘునాథ్ యం.కె మరియు బాబు లాల్ తెలుగు అనువాదము: మల్లకార్జున. జి

మరిన్ని వివరాల కొరకు సంప్రదించండి: నిర్దేశకులు

📍 కేంద్ర పట్టు పరిశోధన మరియు శిక్షణ సంస్థ (CSRTI) కేంద్ర పట్టు మండలి, జొళి మంత్రిత్వ శాఖ భారత ప్రభుత్వము, శ్రీరాంపుర మైసూరు - 570008

☎ 0821-2362757, 2362406

🌐 www.csrtimys.res.in

✉ csrtimys.csb@nic.in

మల్చరీ వేరు కుళ్ళ వ్యాధి నియంత్రణకు ముందస్తు జాప్ర త్త లు



కేంద్ర పట్టు పరిశోధన మరియు శిక్షణా సంస్థ, కేంద్ర పట్టు మండలి, జొళి మంత్రిత్వ శాఖ భారత ప్రభుత్వము, శ్రీరాంపుర మైసూరు - 570008

మల్లూరి సాగులో వేరు కుళ్ళు వ్యాధి నేల నుండి సంక్రమించు అంటువ్యాధి మరియు మొక్కలను పూర్తిగా చంపివేయు లక్షణం కలది. ప్రధానంగా మే మరియు జూన్ నెలలో దీని ప్రభావం చాల తీవ్రంగా ఉంటుంది. వర్షాకాలం ముందు ఉండే దీర్ఘకాల పొడి వాతావరణం దీనికి అనుకూలం, అందువలన దీని నివారణ కొరకు ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవలసి ఉంటుంది.

వ్యాధి లక్షణాలు


- ఆకులు పసుపురంగులోకి మారడం, అకస్మాత్తుగా ఆకులు వడలిపోయి, ఎండిపోయి రాలిపోవడం వేరు కుళ్ళు వ్యాధి యొక్క ప్రారంభపు లక్షణాలు.
- మొక్కల యొక్క వేర్లు కుళ్లిపోవడం వలన మొక్కలను తేలికగా పెరికి తీయవచ్చు, వ్యాధి సోకిన వేర్లు గోధుమరంగులో ఉండి తరువాత బొగ్గును పోలిన నల్లని రంగులోకి మారుతాయి, అంతేకాకుండా మిగిలిన కాండం యొక్క కణజాలం బలహీనంగా మారుతుంది



వ్యాధి నివారణకు తీసుకోవలసిన సమగ్ర పద్ధతులు మరియు ముందస్తు జాగ్రత్తలు

a. రసాయనిక పద్ధతి

- మల్లూరి తోటలో పైన తెలిపినటువంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే, అటువంటి మొక్కలను 30 సెం. మీ. ఎత్తులో కత్తిరించి మొక్క చుట్టూ 20-30 సెం. మీ. వెడల్పు విస్తీర్ణం గోతని తయారుచేసుకోవాలి. 0.5 % రాట్ ఫిక్స్ డ్రావణాన్ని తయారు చేసుకొని దానిని మొక్క యొక్క కాండం మరియు మొక్క చుట్టూ పోసి, వెంటనే దానిని మట్టితో గట్టిగ కప్పివేయాలి.
- వ్యాధి సోకిన మొక్క పరిసరాలలో ఉన్న ఆరోగ్యవంతమైన మొక్కలకు కూడా ఇదే విధంగా చేయాలి.
- గతంలో వ్యాధి సోకిన మరియు వ్యాధి నుండి కోలుకున్న మొక్కలు గల ప్రాంతాలలో / మొక్కలకు 0.5 % రాట్ ఫిక్స్ డ్రావణాన్ని (5 గ్రా / లీ నీటికి) పోయాలి.
- ఒకవేళ రాట్ ఫిక్స్ లభించని ఎడల 0.2 % కార్బండజీం 12 % మరియు మాంకోజెబ్ ౬3 % మిశ్రమం గల సాఫ్ / కంపానియన్ / కాంబిప్లస్ / కగుయలలో లభించును. ఇది పురుగుమందు అంగళ్ళలో లభించును.



- ఏదైనా ఒక మందును రాట్ ఫిక్స్ ఉపయోగించు విధానంలో / పద్ధతిలో వీటిని కూడా ఉపయోగించవలెను. 10 రోజుల పాటు మల్లూరి తోటలోని ఆకును పట్టుపురుగులకు మేతగా ఉపయోగించరాదు.
- కొత్త తోటల కోసం: 0.1% బావిస్టిన (కార్బండజీం 50% డబ్బూ పి) డ్రావణం లేదా 0.4% (4 గ్రా/లీ నీరు) రాట్ ఫిక్స్ డ్రావణంలో మల్లూరి మొక్కలను 30 నిమిషాల పాటు ముంచి ఉంచి తరువాత నాటాలి.
- మొక్కలను నాటువేసే గుంతలను 10 గ్రా డైథాన్ యం-45 (మాంకోజెబ్ 75% డబ్బూ పి) చల్లి తరువాత మొక్కలను నాటాలి.

b. జీవ నియంత్రణ పద్ధతి

- ట్రైకోడెర్మా హరిజియానం + సేంద్రీయ ఎరువు ఉపయోగించుట: ఒక కిలో ట్రైకోడెర్మా హరిజియానం ను 50 కిలోల పొడి చేసిన పశువుల ఎరువుతో కలిపి తగినంత నీటిని చిలకరించి తయారుచేసుకోవాలి.
- తయారుచేసిన మిశ్రమాన్ని కుప్పగా పోసి నీడలో ఉంచి గోనె సంచులతోగాని లేదా ఆకులతోగాని కప్పి ఉంచాలి. 4 రోజుల తరువాత కుప్పను మరల కలుపుకొని అవసరము అయితే నీటిని చల్లుకోవాలి.
- 8 రోజుల తరువాత ట్రై. హరిజినిం మిశ్రమం వృద్ధిచెంది ఉంటుంది.
- తయారు అయిన మిశ్రమం ౧౦౦ మొక్కలకు సరిపోవును (500 గ్రా / మొక్క). మిశ్రమాన్ని 15 సెం.మీ లోతులో వేసి మట్టిని కప్పి నీరు పట్టాలి.

